

PROVA NON ESTRATTA 15/11/2022 Gine B

ASST SS PAOLO CARLO

Filippo Dolati

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2
POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO FISIOTERAPISTA CAT.
D A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO

PROVA SCRITTA 1



1. Quale di questi muscoli flette il ginocchio?

- A. Quadricipite
- B. Bicipite femorale
- C. Tibiale anteriore

2. La SLA è una patologia:

- A. Dei neuroni sensitivi
- B. Sclerosante
- C. Del motoneurone

3. Azione del muscolo bicipite brachiale:

- A. Prona l'avambraccio
- B. Flette la spalla
- C. Estende il gomito

4. Cos'è la frattura di Colles?

- A. Una frattura del radio distale
- B. Una frattura del radio prossimale
- C. Una frattura del terzo medio dell'ulna

5. Quali di questi sintomi è tipico della Malattia di Parkinson?

- A. Ipertono spastico
- B. Flaccidità
- C. Tremore a riposo

6. Cos'è la scala di Barthel?

- A. La scala di valutazione di disturbi di attenzione
- B. La scala di valutazione dell'autonomia
- C. La scala di valutazione delle funzioni cognitive

7. Come si esegue il Test di Lasegue?

- A. Paziente supino flessione d'anca
- B. Paziente prono, estensione d'anca
- C. Paziente in decubito laterale, abduzione d'anca

8. Quale di questi è un effetto delle onde d'urto?

- A. Crioterapia
- B. "wash out" con rimozione delle sostanze infiammatorie
- C. Passaggio degli ioni da un polo all'altro

9. In caso di lesione del nervo mediano, in quale regione anatomica la sensibilità è conservata?

- A. Primo dito mano
- B. Quinto dito mano
- C. Secondo dito

df

- 10. Il carico post-intervento di protesi d'anca cementata viene generalmente concesso (mediato da ausilio):**
- A. In terza giornata dopo l'intervento
 - B. In prima giornata dopo l'intervento
 - C. In quindicesima giornata dopo l'intervento
- 11. Per spostare un paziente da barella a letto è indicato:**
- A. L'utilizzo dei teli ad alto scorrimento
 - B. L'utilizzo della tavola ad alto scorrimento
 - C. L'utilizzo della cintura ergonomica
- 12. La paralisi ostetrica di Klumpke-Dejerine consiste in:**
- A. Paralisi dei muscoli innervati dal plesso brachiale superiore
 - B. Paralisi dei muscoli innervati dal plesso brachiale inferiore
 - C. Paralisi dei muscoli innervati dal plesso brachiale
- 13. Origine del muscolo tibiale anteriore:**
- A. Faccia antero-laterale della tibia
 - B. 1/3 posteriore della tibia
 - C. Faccia anteriore del perone
- 14. Inserzione del muscolo bicipite brachiale:**
- A. Olecrano
 - B. Stiloide ulnare
 - C. Tuberosità radiale
- 15. È una troclea:**
- A. L'articolazione coxofemorale
 - B. L'articolazione interfalangea
 - C. L'articolazione omero radiale
- 16. Quale corrente è indicato utilizzare per l'elettrostimolazione di un muscolo denervato?**
- A. Quadrangolare
 - B. Continua
 - C. Triangolare
- 17. Il test di Romberg è negativo nel paziente:**
- A. Cerebellare
 - B. Vestibolare
 - C. Con deficit sensitivo
- 18. Fa parte dei muscoli della cuffia dei rotatori:**
- A. Sovraspinato
 - B. Tricipite
 - C. Deltoide
- 19. La mano cadente è tipica della lesione di quale nervo?**
- A. Mediano
 - B. Radiale
 - C. Ulnare
- 20. La rotula è un osso:**
- A. Sesamoide
 - B. Lungo
 - C. Corto
- 21. Fa parte della filiera del carpo:**
- A. Semilunare
 - B. Sottocapitato
 - C. Quinto metacarpale

ofs

22. Cos'è l'angolo di inclinazione?

- A. L'angolo che misura l'antiversione del collo femorale
- B. L'angolo che misura il valgismo fisiologico del gomito
- C. L'angolo che misura la curvatura di una scoliosi sul piano frontale

23. Qual è la miglior condizione per la deglutizione in un pz tracheostomizzato con cannula cuffiata?

- A. Con cuffia sgonfia a cannula preferibilmente aperta
- B. Con cuffia gonfia preferibilmente a 5 cmH₂O e preferibilmente a cannula chiusa
- C. Con cuffia sgonfia preferibilmente a cannula chiusa

24. Il test di Thompson:

- A. Si utilizza per valutare la lunghezza dei flessori dell'anca
- B. Si utilizza per ipotizzare una rottura del tendine d'Achille
- C. In statistica è una distribuzione di probabilità continua che governa il rapporto tra due variabili aleatorie

25. In seguito a frattura amielica stabile del soma vertebrale di L3 il carico è concesso:

- A. A guarigione radiografica avvenuta
- B. Da subito utilizzando un corsetto per iperestensione a tre punti
- C. Da subito, ma solo in posizione seduta utilizzando un corsetto per iperestensione a tre punti

26. Quale nervo può essere elettrostimolato per ridurre l'iperattività vescicale

- A. Nervo tibiale posteriore
- B. Nervo otturatorio
- C. Nervo gluteo superiore

27. È peculiarità del dolore persistente:

- A. Una durata superiore ai sei mesi
- B. La presenza della noxa patogena
- C. Una durata superiore a trenta giorni

28. L'allodinia è caratteristica di una lesione:

- A. Talamica
- B. Cerebellare
- C. Frontale

29. La Sindrome di Foville:

- A. È espressione di una lesione a livello pontino
- B. È data da una lesione che interessa la cauda equina
- C. È data da una lesione combinata delle radici di c5 e c6

30. La Malattia di Kohler:

- A. Colpisce generalmente i bambini tra 3 e 5 anni di età
- B. Provoca deformità a livello delle articolazioni metacarpo falangee
- C. Nell'adulto può evolvere in artrite deformante

Q/S