

NON ESTIMATA 10/04/2025 MAF 

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N.30 POSTI
PER INFERMIERE - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA
SALUTE E DEI FUNZIONARI -**



PROVA SCRITTA N.1

1. Il BMI misura:
 - a. L'indice di massa corporea
 - b. Il rischio di caduta
 - c. La circonferenza cranica del neonato
2. Qual è la definizione di bradicardia?
 - a. Frequenza cardiaca < 60 battiti/minuto
 - b. Frequenza respiratoria < 8 atti/minuto
 - c. Frequenza cardiaca > 120 atti/minuto
3. Quale tra le seguenti patologie può essere trasmessa per via aerea?
 - a. Clostridium difficile
 - b. Tubercolosi
 - c. Tumore polmonare
4. Per prevenire l'insorgere di lesioni da pressione è necessario:
 - a. Ridurre al minimo la frizione e l'attrito sulla superficie d'appoggio della cute
 - b. Evitare le variazioni di decubito
 - c. Trascinare il paziente sulle lenzuola durante il rifacimento del letto
5. In caso di contenzione fisica è necessario registrare:
 - a. Marca del presidio utilizzato
 - b. Colore del presidio contenitivo utilizzato
 - c. Tipologia, durata e motivazione della contenzione
6. Per la misurazione del dolore l'infermiere può avvalersi della:
 - a. Scala visivo analogica VAS
 - b. Scala di Braden
 - c. Scala di Conley

7. Il quadro clinico della disidratazione è caratterizzata da:
- Crisi ipertensiva
 - Secchezza della cute, tachicardia, oliguria, ipotensione
 - Iperglicemia
8. Cosa significa oliguria?
- Aumentata produzione di urina, con escrezione di un volume > 1500 ml/24 ore
 - Aumentata produzione di urina, con escrezione di un volume > 3000 ml/24 ore
 - Ridotta produzione di urina, con escrezione di un volume < 500 ml/24 ore
9. Quali tra i seguenti principi attivi rientra nella categoria dei farmaci diuretici?
- Paracetamolo
 - Furosemide
 - Morfina
10. Quali segni sono riscontrati nel paziente con iperglicemia?
- Ipoacusia
 - Ipertermia
 - Aumento della diuresi
11. Cosa si intende per disartria?
- Difficoltà nella deambulazione
 - L'incapacità di articolazione della parola
 - Alterazioni del campo visivo
12. Il paziente in edema polmonare acuto deve essere posizionato:
- Seduto
 - Supino
 - Prono
13. Il polso carotideo è reperibile:
- Nella parte posteriore del ginocchio
 - Sul collo a lato della laringe
 - Sul dorso del piede
14. Cosa valuta la scala Glasgow Coma Scale (GCS)?
- L'intensità del dolore
 - Il rischio di malnutrizione
 - Lo stato di coscienza

15. Per ematemesi si intende:
- L'emissione di sangue attraverso il vomito
 - La presenza di sangue nelle urine
 - La presenza di sangue nelle feci
16. Cosa indica il termine apnea?
- Aumento della frequenza respiratoria sopra i 100 atti al minuto
 - Aumento della frequenza respiratoria sopra i 20 atti al minuto
 - Assenza di atti respiratori o pausa superiore ai 15 secondi
17. Le infezioni correlate all'assistenza sono:
- Complicanze dovute alla mancanza di un caregiver
 - Infezioni contratte durante l'assistenza sanitaria
 - Infezioni presenti al domicilio già manifeste prima del ricovero ospedaliero
18. Quale è uno degli scopi della nutrizione enterale attraverso sondino nasogastrico?
- Garantire un apporto nutrizionale adeguato a chi non è in grado di alimentarsi
 - Garantire il riempimento della vescica
 - Aumentare il volume dello stomaco
19. La posizione laterale di sicurezza è indicata in caso di:
- Paziente incosciente con respiro e segni di circolo presenti
 - Paziente con protesi endotracheale
 - Paziente con frattura scomposta di femore
20. Chi si occupa di constatare il decesso?
- L'infermiere
 - L'OSS
 - Il medico

NON ESTRATTA 10/04/2025 Jell # 100

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N.30 POSTI
PER INFERMIERE - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA
SALUTE E DEI FUNZIONARI -**



PROVA SCRITTA N.2

1. Viene definita tachicardia la frequenza cardiaca:
 - a. >100 battiti/minuto
 - b. <60 battiti/minuto
 - c. Tra i 60 e gli 80 battiti/minuto
2. Quale tra le seguenti patologie può essere trasmessa per via orofecale?
 - a. Clostridium difficile
 - b. Tubercolosi
 - c. Tumore polmonare
3. Per il trattamento delle lesioni da pressione bisogna considerare:
 - a. La riduzione della vista
 - b. Lo stato nutrizionale
 - c. L'ipoacusia
4. La contenzione fisica:
 - a. È un atto straordinario
 - b. Non deve mai essere prescritta
 - c. E' sempre obbligatoria per diminuire lo stato di agitazione del paziente
5. In quali situazioni è indicata la somministrazione di un enteroclisma?
 - a. Piressia
 - b. Edemi declivi
 - c. Stipsi
6. Una lesione da pressione al 1° stadio viene definita come:
 - a. Esposizione dell'osso del tendine o del muscolo
 - b. Cute intatta con arrossamento non sbiancabile in zona adiacente o opposta a una prominenza ossea
 - c. Necrosi dei tessuti con formazione di escara

7. Quale scala viene utilizzata per la valutazione del rischio di insorgenza di lesioni da pressione:
- Braden
 - VAS
 - MMSE
8. Come viene definita la frequente necessità di eliminazione urinaria notturna?
- Ematuria
 - Proteinuria
 - Nicturia
9. Quali tra i seguenti principi attivi ha proprietà antalgiche?
- Paracetamolo
 - Furosemide
 - Bisoprololo
10. Quali segni sono riscontrati in caso di ipoglicemia?
- Rash cutaneo diffuso
 - Alterazione dello stato di coscienza
 - Edemi declivi
11. Cosa si intende per afasia?
- Difficoltà nella deambulazione causata da una progressiva perdita della coordinazione muscolare
 - Perdita parziale o completa della capacità di esprimersi o comprendere parole scritte o verbali
 - Difficoltà durante la minzione
12. Durante la somministrazione di un clistere evacuativo il paziente deve essere posizionato
- Sul fianco sinistro
 - In ortostatismo
 - Prono
13. Lo stato di coscienza viene valutato attraverso la scala:
- Numerical Rating Scale
 - Malnutrition Universal Screening Tool
 - Glasgow Coma Scale

14. Si definisce “Anomalia di colorazione giallastra della cute e delle mucose causata da iperbilirubinemia”:
- Cianosi
 - Ittero
 - Anemia
15. Per ematuria si intende:
- L’emissione di sangue attraverso il vomito
 - La presenza di sangue nelle urine
 - La copiosa presenza di materiale ematico nelle feci
16. Il drenaggio della ferita chirurgica viene posizionato per:
- Misurare la pressione venosa centrale
 - Agevolare la fuoriuscita di fluidi dal sito di incisione chirurgica
 - Monitorare la diuresi
17. Le infezioni contratte durante l’assistenza sanitaria sono definite con il termine:
- ICA
 - OMS
 - MRSA
18. La posizione di Trendelenburg è indicata in caso di:
- Paracentesi
 - Episodio lipotimico
 - Nausea e vomito
19. L’indice di massa corporea si esprime attraverso:
- Apgar
 - BMI
 - Scala di Brass
20. Cosa indica il termine triage?
- Una manovra di rianimazione cardio polmonare
 - L’attribuzione dell’ordine di trattamento dei pazienti sulla base delle loro necessità di cura e delle risorse disponibili
 - La scala di valutazione del dolore

PROVA ESTRATTA

MP Sem

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N.30 POSTI
PER INFERMIERE - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA
SALUTE E DEI FUNZIONARI -**



PROVA SCRITTA N.3

1. La tachipnea è caratterizzata da:
 - a. Frequenza respiratoria > 20 atti/min
 - b. Frequenza cardiaca < 60 atti/min
 - c. Frequenza respiratoria < 8 atti/min
2. Quale tra le seguenti patologie può essere trasmessa per via parenterale:
 - a. Salmonella
 - b. HIV
 - c. Tumore polmonare
3. Il materasso antidecubito:
 - a. Evita la mobilizzazione del paziente
 - b. Crea condizioni favorevoli all'insorgenza di lesioni da pressione
 - c. Riduce il rischio di insorgenza di lesioni da pressione
4. La prescrizione medica per la contenzione fisica dei pazienti:
 - a. Non è prevista
 - b. È sempre necessaria
 - c. È prevista solo per pazienti con età superiore a 65 anni
5. Le feci picee sono:
 - a. Di colore verde
 - b. Di colore bianco
 - c. Di colore nero perché miste a sangue digerito
6. Quali delle seguenti patologie prevede l'isolamento respiratorio del paziente?
 - a. Clostridium Difficile
 - b. Tuberculosis Polmonare
 - c. Sifilide

7. Cosa indica il termine nicturia?
 - a. Ripetuto bisogno di urinare durante il riposo notturno
 - b. Aumentata produzione di urina, con escrezione di un volume > 1500 ml/24 ore
 - c. Assenza della diuresi
8. Quali tra i seguenti principi attivi è un antipiretico?
 - a. Paracetamolo
 - b. Furosemide
 - c. Bisoprololo
9. Quali segni sono riscontrati in caso di ipertermia?
 - a. Brividi
 - b. Prurito diffuso
 - c. Edemi declivi
10. Cosa si intende per atrofia muscolare?
 - a. Aumento della massa corporea
 - b. Riduzione del volume e della funzionalità dei muscoli
 - c. Stato di disidratazione
11. In caso di perdita di coscienza il paziente deve essere posizionato:
 - a. Seduto
 - b. In posizione laterale di sicurezza
 - c. Prono
12. Cosa indica il termine apnea?
 - a. Aumento della frequenza respiratoria sopra i 100 atti al minuto
 - b. Aumento della frequenza respiratoria sopra i 20 atti al minuto
 - c. Assenza di atti respiratori o pausa superiore ai 15 secondi
13. La malnutrizione nel paziente ospedalizzato viene rilevata attraverso la scala:
 - a. Numerical Rating Scale
 - b. Malnutrition Universal Screening Tool
 - c. Glasgow Coma Scale
14. L'incontinenza urinaria si definisce come:
 - a. Emissione involontaria di urina
 - b. Ritenzione di urina in vescica
 - c. Stimolo minzionale controllato

15. La pressione sanguigna è espressa in:
- mmHg
 - atti/min
 - gr/dL
16. Il termine ICA indica:
- La scala di misurazione del dolore
 - L'acronimo per identificare i dispositivi di protezione individuale
 - Le infezioni correlate all'assistenza
17. Durante la somministrazione di un clistere evacuativo il paziente deve essere posizionato
- Sul fianco sinistro
 - In ortostatismo
 - Prono
18. Le cure palliative comprendono:
- L'iter riabilitativo dei pazienti affetti da patologia psichiatrica
 - Monitoraggio e trattamento intensivo dei pazienti critici
 - Il trattamento e il sostegno di persone affette da malattie inguaribili, potenzialmente letali e/o cronico-progressive
19. In caso di comparsa di brividi scuotenti in corso di emotrasfusione, l'infermiere deve:
- Completare la trasfusione in attesa dell'arrivo del medico
 - Somministrare farmaco antipertensivo per via orale
 - Interrompere immediatamente la trasfusione, avvisare il medico e rilevare i parametri vitali
20. Prima di essere sottoposto a paracentesi, il paziente deve:
- Bere 3 Litri di acqua
 - Fare attività fisica
 - Svuotare la vescica