



CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI DIRIGENTE FARMACISTA DISCIPLINA DI FARMACIA OSPEDALIERA A TEMPO PUBBLICO E INDETERMINATO

PROVA SCRITTA n 2

n. 1 Oritavancina è indicata:

1. nel trattamento di infezioni, incluse HAP/VAP e batteriemie associate, causate da batteri Gram negativi resistenti ai carbapenemi nei quali vi siano opzioni terapeutiche limitate
2. nel trattamento di pazienti adulti con endocardite infettiva del cuore destro da Staphylococcus aureus
3. nel trattamento di infezioni batteriche acute della cute e della struttura cutanea negli adulti in monosomministrazione

n. 2 Indica quale delle seguenti affermazioni è falsa: Erenumab è

1. Un anticorpo monoclonale agonista del peptide correlato al gene della calcitonina
2. Somministrato SC una volta al mese
3. In fascia A-PHT, file F tipologia 6

n. 3 Andexanet alfa è

1. Indicato nel trattamento di emorragie potenzialmente fatali in pazienti in terapia anticoagulante con rivaroxaban e dabigatran
2. Indicato nel trattamento di emorragie potenzialmente fatali in pazienti in terapia anticoagulante con NAO
3. Indicato nel trattamento di emorragie potenzialmente fatali in pazienti in terapia anticoagulante con rivaroxaban e apixaban

n. 4 Quali farmaci sono indicato per Il trattamento di soggetti adulti con COVID-19 di grado lieve o moderato che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono a maggior rischio di progressione verso forme severe di COVID-19, entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi:

1. desametasone
2. remdesivir
3. baricitinib

n. 5 Pembrolizumab è indicato nel trattamento di prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico non squamoso il cui tumore non è positivo per mutazioni di EGFR o per ALK. in associazione a

1. Carboplatino
2. Carboplatino+Paclitaxel
3. Pemetrexed + Sali di platino



PROVA ESTRATTA

9/2/23

Guerra Lhoni



ASST Santi Paolo e Carlo

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI DIRIGENTE FARMACISTA DISCIPLINA DI FARMACIA OSPEDALIERA A TEMPO PUBBLICO E INDETERMINATO

- n. 6 In relazione all'inserimento in Dispovigilance di una segnalazione di incidente da dispositivo medico da parte di un operatore sanitario, indica la risposta errata:
1. obbligo di segnalazione di un incidente grave entro 10 giorni dalla conoscenza dell'evento
 2. obbligo di segnalazione di un incidente non grave entro 30 giorni dalla conoscenza dell'evento
 3. obbligo di segnalazione di sospetto incidente grave entro 10 giorni dalla conoscenza dell'evento
- n. 7 Quale dei seguenti cateteri sono considerati accessi venosi centrali:
1. PICC
 2. midline
 3. ago cannula
- n.8 Descrivi brevemente le due tipologie di liste dei farmaci erogabili ai sensi della legge 648 e le condizioni di rimborsabilità
- n. 9 Per la classe degli inibitori delle JAK, indica:
- il meccanismo d'azione
 - se si tratta di molecole biologiche o di sintesi
 - le patologie in cui vengono impiegati
- n. 10 Farmaci ricompresi nella nota 100, descrivi:
- le classi ed il meccanismo d'azione
 - le limitazioni prescrittive
 - le eventuali indicazioni aggiuntive



Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large blue checkmark-like signature.

PROVA ESTRATTA

9/2/2023

Guerrigiani



ASST Santi Paolo e Carlo

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI DIRIGENTE FARMACISTA DISCIPLINA DI
FARMACIA OSPEDALIERA A TEMPO PUBBLICO E INDETERMINATO
PROVA PRATICA N.3

Paziente di sesso femminile, anni 70 affetta da carcinoma mammario metastatico. BSA 1,6 , peso 60 Kg in
terapia con Trastuzumab e docetaxel trisettimanale.

- Calcolare la dose dei due farmaci, considerando che la posologia prevista per trastuzumab è pari a 6 mg/Kg e per docetaxel è pari a 75 mg/mq
- Descrivere l'allestimento della preparazione indicando il volume di farmaco da prelevare per ottenere il corretto dosaggio, il volume della sacca per la diluizione e la velocità della somministrazione, sapendo che:

Trastuzumab in flacone 150 mg viene ricostituito con 7,2 ml di acqua p.p.i., successivamente diluito in 250 ml di NaCl 0.9% per essere somministrato in 30 minuti nei giorni successivi alla dose di carico.


Docetaxel in flacone da 80 mg in 4 ml deve essere somministrato in 60 minuti, dopo diluizione con NaCl 0.9% in sacca per ottenere una concentrazione non superiore a 0,74 mg/ml

- Descrivere i vantaggi di una preparazione centralizzata dei chemioterapici /antiblastici, i requisiti del laboratorio e i controlli necessari da eseguire per garantire la sterilità dei locali e quindi del prodotto finito

PROVA ESTRATTA

08/02/23

[Handwritten signature]



[Two handwritten signatures]


CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE FARMACISTA DISCIPLINA FARMACIA OSPEDALIERA, A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO

ASST - Santi Paolo e Carlo - Presidio San carlo il 09/02/2023 alle ore 09:30

PROVA ORALE N.2

1. Raccomandazione Ministeriale n.1

2. File F tipologia 1 Regione Lombardia



PROVA ESTRATTA 10/02
2023

Opelino

