


SANTANGELO
REA ROSA

CRISTINA
Re Rea

Unita Fed/6 415113
04/5/27



PROVA N. 1

1. La corretta definizione di febbre in puerperio fa riferimento
 - a. Alla presenza di temperatura corporea maggiore o uguale a 38°C dopo 24 ore dal parto, che si mantiene tale per oltre 24 ore
 - b. Alla presenza di temperatura corporea maggiore o uguale a 38.5°C dopo 48 ore dal parto, che si mantiene tale per oltre 24 ore
 - c. Alla presenza di temperatura corporea maggiore o uguale a 39°C dopo 48 ore dal parto, che si mantiene tale per oltre 36 ore

2. La lacerazione perineale di primo grado comprende
 - a. Lesione della cute perineale e dei muscoli perineali
 - b. Lesione dei muscoli perineali e dello sfintere dell'ano
 - c. Lesione della mucosa vaginale o della cute perineale

3. Al punteggio di Apgar viene attribuito il valore di 1 alla frequenza cardiaca neonatale quando
 - a. FC (frequenza cardiaca) > 100
 - b. FC < 100
 - c. FC < 60

4. Le otoemissioni acustiche evocate sono
 - a. uno screening neonatale
 - b. un esame di diagnosi precoce dell'ipoacusia permanente infantile
 - c. un esame di diagnosi precoce della sordità congenita

5. Tra i fattori di rischio per la placenta previa vi sono
 - a. Pregressa chirurgia uterina, gravidanza gemellare, età materna avanzata
 - b. Pregressa chirurgia uterina, anidramnios, diabete gestazionale
 - c. Primiparità, fumo, età materna avanzata

6. I segni tipici che caratterizzano la pre-eclampsia sono
 - a. ipertensione associata a proteinuria
 - b. dolore epigastrico associato a contrattilità uterina irregolare
 - c. cefalea e iperpiressia

7. Individui la definizione errata
 - a. La procidenza di funicolo si ha quando, a membrane rotte, il funicolo si trova davanti alla parte presentata
 - b. Il prollasso occulto si ha quando il funicolo si trova a lato della parte presentata, interposto tra questo e la pelvi
 - c. Il prollasso di funicolo si ha quando, a membrane rotte, il funicolo si trova davanti alla parte presentata

8. Quale delle seguenti situazioni cliniche non è un'indicazione per l'istero-salpingografia?
- Cisti ovarica
 - Sterilità primaria o secondaria
 - Aborti spontanei ripetuti
9. Per la rianimazione neonatale, l'adrenalina va diluita
- 1 fiala di 1mg portata a 10ml
 - 1 fiala di 1mg portata a 20ml
 - 1 fiala di 1mg portata a 5ml
10. Entro quale periodo è consentita l'interruzione farmacologica di gravidanza?
- 12[^] settimana
 - 9[^] settimana
 - 7[^] settimana
11. Le indicazioni per la gestione del travaglio e del parto di una paziente precesarizzata prevedono
- L'utilizzo di prostaglandine vaginali per indurre il travaglio, ma non consentono lo scollamento delle membrane
 - il monitoraggio della frequenza cardiaca fetale ad intermittenza ogni 15 minuti , ma non suggeriscono il monitoraggio cardiocografico in continua
 - il divieto di utilizzo delle manovre di Kristeller
12. Cosa si intende per menorragia
- Perdite di sangue tra un ciclo e l'altro
 - Flusso mestruale troppo abbondante
 - Perdite di sangue nelle urine
13. Tra gli effetti indesiderati dell'analgia peridurale vi è
- Un aumento della durata del I stadio del travaglio
 - Un aumento della durata del II stadio del travaglio
 - Una maggior frequenza di neonati con basso punteggio di Apgar alla nascita
14. L'isteroscopia operativa deve essere eseguita tra
- 15° / 20° giorno del ciclo mestruale
 - 5° / 10° giorno del ciclo mestruale
 - 20° / 25° giorno del ciclo mestruale
15. Se la differenza del pH tra i due campioni (arteria e vena) prelevati sul funicolo al parto è <0,02
- i campioni provengono dallo stesso vaso
 - i campioni sono alterati
 - lo strumento per l'analisi è guasto



16. Si definisce morte materna

- a. la morte di una donna durante la gravidanza o entro 42 giorni dal suo termine
- b. la morte per qualsiasi causa legata o aggravata dalla gravidanza
- c. entrambe le precedenti

17. L'indice di Pearl valuta

- a. la percentuale di rischio di insorgenza di un carcinoma mammario
- b. l'efficacia di un metodo contraccettivo
- c. il rapporto rischio-beneficio dell'utilizzo di un estroprogestinico

18. Secondo le Linee di Indirizzo Nazionali 8/2019 i codici di triage intraospedaliero sono in totale


- a. 4
- b. 5
- c. 6

19. E' una controindicazione all'allattamento al seno

- a. Galattosemia nel neonato
- b. Mastite
- c. Ingorgo mammario

20. Quali tra le seguenti situazioni è un'indicazione all'esecuzione di colposcopia?:

- a. Leucorrea recidivante
- b. Anomalie al pap- test
- c. Dispareunia



PROVA N. 2



1. Tra i fattori di rischio per le infezioni in puerperio vi sono:
 - a. Parto precipitoso, manovre ostetriche, anemia
 - b. Parto operativo, primiparità, febbre in travaglio
 - c. Traumatismi, parto precipitoso, parto oltre il termine

2. La lacerazione perineale di secondo grado comprende.
 - a. Lesione della mucosa vaginale o della cute perineale
 - b. Lesione dei muscoli perineali che non coinvolge lo sfintere dell'ano
 - c. Lesione della cute perineale e dello sfintere dell'ano

3. Il distacco intempestivo di placenta deve essere sospettato ogni qualvolta si presenti una paziente
 - a. al primo trimestre riferendo forti dolori addominali
 - b. al secondo-terzo trimestre riferendo rialzo della temperatura, dolori addominali e crampi agli arti inferiori
 - c. al secondo-terzo trimestre riferendo perdite ematiche, dolore e attività contrattile

4. In caso di mola vescicolare andranno monitorati fino a negativizzazione i valori di
 - a. hCG
 - b. emoglobina
 - c. ferritina

5. La HELLP Syndrome è una variante grave della pre-eclampsia caratterizzata da
 - a. diminuzione degli enzimi epatici e delle piastrine
 - b. emolisi, aumento degli enzimi epatici e diminuzione delle piastrine
 - c. diminuzione delle piastrine e diminuzione dell'LDH

6. L'impianto contraccettivo sottocutaneo ha una durata di
 - a. 5 anni
 - b. 3 anni
 - c. 1 anno

7. Secondo le Linee di Indirizzo Nazionali 8/2019, per il codice di triage numero 2 è previsto un tempo massimo di attesa di
 - a. 120 minuti
 - b. 60 minuti
 - c. 15 minuti


8. Le decelerazioni tardive
 - a. si manifestano preferenzialmente in presenza di patologie ipossiche feto-placentari
 - b. derivano dalla compressione del funicolo durante la contrazione
 - c. se si accompagnano a presenza di buona variabilità si definiscono "shallow late"

9. Il tracciato cardiocografico sinusoidale è un raro caso in cui la FCF presenta
- Per almeno 15 minuti grandi oscillazioni uniformi al di sopra e al di sotto della linea di base, conservando la normocardia, con un'ampiezza di 3-5 bpm e presenza di variabilità
 - Per almeno 12 minuti grandi oscillazioni uniformi al di sopra e al di sotto della linea di base, non conservando la normocardia, con un'ampiezza di 3-10 bpm e presenza di variabilità
 - Per almeno 20 minuti piccole oscillazioni uniformi al di sopra e al di sotto della linea di base, conservando la normocardia; presentano un'ampiezza di 5-15 bpm e generalmente la variabilità è minima o assente
10. La complicanza materna più frequente della procedura di analgesia peridurale è
- Ematoma spinale
 - Puntura della dura madre
 - Iperensione
11. Qual è il sintomo più comune dell'endometriosi?
- Dolore pelvico
 - Dolore retrosternale
 - Perdite ematiche vaginali
12. Si sospetta una posizione occipito-posteriore in caso di
- sensazione di premito precoce difficilmente controllabile
 - dolore alle contrazioni riferito a livello lombosacrale
 - tutte le precedenti
13. Tra i parametri registrati nella scheda MEOWS vi sono
- Frequenza cardiaca fetale, stato di coscienza, attività contrattile uterina
 - Pressione arteriosa sistolica, frequenza cardiaca e stato di coscienza
 - Temperatura, frequenza respiratoria e attività contrattile uterina
14. Un neonato viene definito "late preterm"
- Se l'epoca gestionale al parto è compresa tra 34 e 36 settimane + 6 giorni
 - Se l'epoca gestionale al parto è compresa tra 37 e 38 settimane + 2 giorni
 - Se l'epoca gestionale al parto è compresa tra 37 e 40 settimane + 3 giorni
15. L'indicazione per l'avvio delle compressioni toraciche neonatali, sempre associate alla ventilazione a pressione positiva, è
- Frequenza cardiaca inferiore a 70 bpm, nonostante una ventilazione adeguata per 60 secondi
 - Frequenza cardiaca inferiore a 60 bpm, nonostante una ventilazione adeguata per 30 secondi
 - Frequenza cardiaca inferiore a 100 bpm, nonostante una ventilazione adeguata per 60 secondi

16. Sono considerati trigger in ostetricia
- Trauma neonatale da parto e rottura d'utero
 - Caduta accidentale materna e taglio cesareo d'emergenza
 - Parto non assistito e applicazione di ventosa ostetrica
17. L'ematocolpo può essere causato da
- Dispositivo intrauterino mal tollerato
 - Cisti ovarica
 - Imene imperforato
18. Il collirio midriatico può essere usato per
- La profilassi neonatale in sala parto
 - L'esecuzione del riflesso rosso neonatale
 - Evitare la secchezza retinica del neonato nei primi giorni dopo la nascita
19. Le fontanelle impari sono
- le fontanelle asteriche
 - le fontanelle pteriche
 - la fontanella maggiore e la fontanella minore
20. I ceppi di HPV responsabili del tumore al collo dell'utero sono
- 16 e 18
 - 6 e 11
 - 52 e 58

Handwritten signature or initials in black ink, consisting of a stylized 'L' and a cursive 'R'.

PROVA N. 3



1. Nella puerpera le più frequenti infezioni con potenzialità di evoluzione verso la sepsi sono
 - a. Mastite, polmonite, infezione delle vie urinarie
 - b. Vaginite da Trichomonas, vaginite da Candida, mastite
 - c. Polmonite, Herpes vaginale, vaginite da lieviti
2. La lacerazione perineale di terzo grado comprende:
 - a. Lesione della mucosa vaginale o della cute perineale
 - b. Lacerazione dei muscoli dello sfintere dell'ano
 - c. Lacerazione dei muscoli perineali e della mucosa vaginale
3. In caso di taglio cesareo, l'incisione addominale di Pfannenstiel dovrebbe essere effettuata
 - a. Sulla linea mediana
 - b. In modo curvilineo, circa 2 dita sopra il margine della sinfisi pubica
 - c. In modo curvilineo, circa 1 dito sotto il margine della sinfisi pubica
4. Nel caso in cui le persone esercenti la potestà o la tutela rifiutassero il loro consenso o esprimessero pareri tra loro difforni, l'interruzione di gravidanza nella paziente minorenni può essere autorizzata da
 - a. medico di fiducia
 - b. giudice tutelare
 - c. direttore sanitario della struttura
5. Tra i fattori di rischio per rottura d'utero in assenza di pregressa cicatrice uterina vi sono
 - a. somministrazione di ossitocina, versione podalica
 - b. anomalie uterine, obesità materna
 - c. macrosomia fetale, anidramnios
6. Fanno parte dei farmaci necessari per affrontare una crisi eclamptica
 - a. nifedipina, bromuro di vecuronio e sulprostone
 - b. sulprostone, midazolam e salbutamolo
 - c. midazolam, calcio gluconato e nifedipina
7. Il Sistema di Trasporto Assistito Materno è la modalità di trasferimento di una gravida che necessita di cure a maggior livello di complessità per
 - a. Solo condizioni materne
 - b. Solo condizioni fetali
 - c. Sia condizioni materne che condizioni fetali
8. Tra i parametri registrati nella scheda MEOWS vi sono
 - a. Frequenza cardiaca fetale, stato di coscienza, attività contrattile uterina
 - b. Pressione arteriosa sistolica, frequenza cardiaca e stato di coscienza
 - c. Temperatura, frequenza respiratoria e attività contrattile uterina

9. I valori di riferimento per il test da carico orale di glucosio (OGTT) con 75 g di glucosio, per effettuare la diagnosi di diabete gestazionale, sono
- Dopo 1 ora maggiore o uguale a 160 mg/dl
 - Dopo 2 ore maggiore o uguale a 153 mg/dl
 - Dopo 1 ora maggiore o uguale a 185 mg/dl
10. La linea di base è
- La frequenza cardiaca fetale media di almeno 5 minuti in un segmento di 15 minuti
 - La frequenza cardiaca fetale media di almeno 2 minuti in un segmento di 10 minuti
 - La frequenza cardiaca fetale media registrata in un periodo di almeno 40 minuti
11. L'ecografia office può essere utilizzata dall'ostetrica
- Nel primo trimestre per visualizzare la camera ovulare e il numero di embrioni
 - Nel secondo trimestre per visualizzare eventuali nodi sul funicolo
 - Nel terzo trimestre per identificare una malformazione fetale
12. Cosa significa LEEP in ginecologia
- Escissione elettrochirurgica con ansa diatermica
 - È il pap-test in forma liquida
 - Una dilatazione della cervice
13. Quale tra le seguenti è una griglia di valutazione che può essere utilizzata in ambito neonatologico?
- Scala NEWS
 - EPDS
 - Score di Finnegan
14. Secondo le Linee di Indirizzo Nazionali 8/2019, per il codice di triage numero 4 è previsto un tempo massimo di attesa di
- 120 minuti
 - 60 minuti
 - 15 minuti
15. La scala LATCH serve per documentare ed esaminare
- I diametri del bacino
 - L'allattamento al seno
 - Il rischio di distress respiratorio del neonato
16. Il foro di Botallo è
- Un foro di comunicazione tra due atri presente tutta la vita
 - Una struttura malformativa
 - Un foro di comunicazione tra i due atri presente durante la vita fetale

17. La profilassi antibiotica intrapartum è raccomandata in caso di
- precedente figlio con infezione neonatale invasiva da GBS (Streptococco Beta emolitico di gruppo B)
 - batteriuria da GBS durante la gravidanza in corso
 - tutte le precedenti
18. Il PICO è
- Un metodo utile per riconoscere il periodo fertile
 - Un metodo utilizzato nella pratica basata sulle evidenze per formulare in modo strutturato un quesito sanitario in ambito di ricerca
 - Un metodo utilizzato per valutare il benessere neonatale in caso di parto operativo in epoche gestazionali inferiori a 35 settimane
19. L'applicazione di acido acetico sulla portio si pratica in corso di
- Colposcopia
 - Isterosalpingografia
 - Inseminazione omologa
20. L'epoca gestazionale più adatta ad un prelievo di villi coriali è
- 11^a settimana
 - 16^a settimana
 - 20^a settimana



RELA ROSA

4/5/23 PROVA ESTIMATA
04/5/23

PROVA N. 2



1. La causa più frequente di emorragia antepartum è:
 - a. La presenza di vasi previ
 - b. Il distacco di placenta
 - c. La placenta previa

2. Secondo le Linee di Indirizzo Nazionali 8/2019, per il codice di triage numero 3 è previsto un tempo massimo di attesa di
 - a. 120 minuti
 - b. 60 minuti
 - c. 15 minuti

3. La placenta previa marginale
 - a. raggiunge o dista più di 3.5 cm dal bordo dell'orifizio uterino interno
 - b. raggiunge o dista meno di 2 cm dal bordo dell'orifizio uterino interno
 - c. raggiunge o dista meno di 1 cm dal bordo dell'orifizio uterino esterno

4. Tra i segni e sintomi più frequentemente associati alla rottura d'utero vi sono
 - a. perdita della contrattilità uterina
 - b. shock
 - c. anomalie della frequenza cardiaca fetale

5. Tra le presentazioni podaliche incomplete, la varietà più frequente è rappresentata da
 - a. varietà piedi e ginocchia
 - b. varietà natiche
 - c. varietà miste

6. Tra i parametri registrati nella scheda MEOVS vi sono
 - a. Frequenza cardiaca fetale, stato di coscienza, attività contrattile uterina
 - b. Pressione arteriosa sistolica, frequenza cardiaca e stato di coscienza
 - c. Temperatura, frequenza respiratoria e attività contrattile uterina

7. Il test da carico orale di glucosio (OGTT) va effettuato a 16-18 settimane in caso di
 - a. BMI maggiore o uguale a 30 e/o diabete gestazionale in una precedente gravidanza
 - b. Riscontro a inizio gravidanza di glicemia compresa tra 93 e 100 e BMI inferiore a 25
 - c. Riscontro a inizio gravidanza di glicemia compresa tra 75 e 92 e/o BMI maggiore o uguale a 32

8. Nelle donne con fenotipo RH (D) negative non sensibilizzate, in quale periodo è consigliata l'immunoprofilassi anti-D?
 - a. entro il primo trimestre
 - b. a 28 settimane
 - c. a 32 settimane

Handwritten signatures at the bottom right of the page.

9. La vaccinazione HPV può essere praticata negli uomini?
 - a. A breve sarà possibile eseguirla
 - b. Solo nelle categorie a rischio
 - c. Sì, è consigliata come per le donne

10. Tra le controindicazioni assolute all'analgesia peridurale troviamo
 - a. La ridotta conta piastrinica
 - b. La presenza di polidramnios
 - c. Il pregresso taglio cesareo

11. Il rapporto che la prima grossa parte del corpo fetale assume con l'ingresso della pelvi è definita
 - a. Atteggiamento
 - b. Presentazione
 - c. Situazione

12. Se al pap-test si riscontra un esito di HSIL
 - a. È presente una lesione intraepiteliale squamosa di alto grado
 - b. È presente un processo infiammatorio che richiede un'adeguata terapia
 - c. E' necessario ripetere il pap- test dopo un anno

13. Le indicazioni alla ventilazione neonatale a pressione positiva sono
 - a. Apnea o gasping o una frequenza cardiaca inferiore a 100 bpm
 - b. Ipotono, punteggio di Apgar inferiore a 8 e frequenza cardiaca inferiore a 120 bpm
 - c. Ipotono e acrocianosi

14. La disfunzione neurologica che può essere causata dall'ipossia/acidosi intrapartum è definita
 - a. Paralisi cerebrale
 - b. Lesione cerebrale da danno asfittico
 - c. Encefalopatia ipossico-ischemica

15. Per lo screening pulsiossimetrico delle cardiopatie congenite critiche nei neonati, si valuta
 - a. indice di perfusione periferica (P.I.), frequenza cardiaca, saturazione pre e post-duttale
 - b. indice di perfusione periferica (P.I.), saturazione pre e post-duttale
 - c. frequenza cardiaca, saturazione pre o post-duttale, polsi radiali

16. Il dosaggio dell'alfafetoproteina viene effettuato per la ricerca di
 - a. anomalie cromosomiche
 - b. difetti del tubo neurale
 - c. trisomia 21

17. L'adenomiosi è

- a. Presenza di endometrio nello spessore del miometrio
- b. Tumore ovarico
- c. Endometriosi ovarica

18. Si definisce grande pluripara

- a. La donna con 4 o più gravidanze esitate in neonati vivi o morti endouterine superiori a 22 settimane
- b. La donna con 6 o più gravidanze esitate in neonati vivi o morti endouterine superiori a 23 settimane
- c. La donna con 5 o più gravidanze esitate in neonati vivi o morti endouterine superiori a 20 settimane

19. Le fontanelle pari sono

- a. La fontanella lambdoidea e quella triangolare
- b. La fontanella anteriore e la fontanella bregmatica
- c. Le fontanelle pteriche e le fontanelle asteriche

20. La HELLP Syndrome è una variante grave della pre-eclampsia caratterizzata da

- a. diminuzione degli enzimi epatici e delle piastrine
- b. emolisi, aumento degli enzimi epatici e diminuzione delle piastrine
- c. diminuzione delle piastrine e diminuzione dell'LDH

