

# ASST SS PAOLO CARLO

Concorso Pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n.2 posti  
Collaboratore Professionale Sanitario – OSTETRICA categoria D



## PROVA 1

25/3/22  
PROVA NON FORNITA  
Valenzano Ascolari

### 1. L'immunoprofilassi anti-D post-amniocentesi:

- deve essere eseguita a tutte le pazienti
- deve essere eseguita alle pazienti Rh negative
- non deve essere eseguita per le possibilità basse di isoimmunizzazione

### 2. Secondo le raccomandazioni per l'assistenza alla donna vittima di violenza sessuale AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani) revisionate a maggio 2020:

- Di fronte ad una vittima di violenza sessuale la priorità assistenziale dovrà essere la tutela della sua salute e del suo benessere
- Di fronte ad una vittima di violenza sessuale la priorità assistenziale dovrà essere la raccolta dei campioni vaginali
- Di fronte ad una vittima di violenza sessuale la priorità assistenziale dovrà essere di capire se il racconto è veritiero e plausibile

### 3. La somministrazione di metilergometrina per via endovenosa:

- viene eseguita se la dose intramuscolare non ha effettuato l'effetto desiderato
- è impossibile perché non viene commercializzata la soluzione adeguata
- è sconsigliata per il rischio di crisi ipertensive e incidenti cerebrovascolari

### 4. Secondo le raccomandazioni "Monitoraggio cardiocografico in travaglio" SIGO (Società Italiana Ginecologia e Ostetricia) revisionate nel 2018, l'auscultazione intermittente

- dovrebbe essere utilizzata di routine per il monitoraggio intrapartum nei travagli fisiologici
- richiede la presenza di un'ostetrica one-to-one dal periodo espulsivo in poi
- non può essere utilizzata in caso di  $\geq 3$  contrazioni in 10min

### 5. L'ecografia office:

- può essere effettuata solamente da ostetriche con il master universitario in "ecografia ostetrica"
- se effettuata da personale con formazione di base permette di identificare condizioni potenzialmente patologiche
- deve essere refertata obbligatoriamente su un documento apposito per le ecografie ostetriche, controfirmato dal medico di guardia

### 6. I segni di certezza della gravidanza comprendono:

- la mancanza delle mestruazioni e l'auscultazione del BCF (battito cardiaco fetale)
- la mancanza delle mestruazioni e il segno di Chadwick
- l'auscultazione del BCF e i MAF (movimenti attivi fetali)

### 7. Se la differenza del pH tra i due campioni (arteria e vena) prelevati sul funicolo al parto è $< 0,02$ :

- i campioni provengono dallo stesso vaso, spesso la vena
- il feto era in acidosi metabolica
- il feto era in acidosi respiratoria

### 8. La determina AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) di agosto 2020 riguardante le modalità di impiego del medicinale Mifegyne a base di Mifepristone:

- Annula il vincolo relativo al farmaco Mifegyne in regime di ricovero al momento dell'assunzione del farmaco fino alla conclusione del percorso assistenziale
- Estende l'impiego del farmaco dal 49° al 63° gg di amenorrea, pari a 9 settimane compiute di epoca gestazionale, in associazione sequenziale con un analogo delle prostaglandine
- Tutte le precedenti

*Scuola Form*

*Blue*

**9. In caso di mutilazioni genitali femminili, in Italia:**

- a. è vietata la reinfibulazione
- b. è autorizzata la reinfibulazione per le donne che lo desiderano e in caso di lacerazione di 3o o 4o grado
- c. è obbligatoria la reinfibulazione

**10. Una gravidanza definita "early term" è compresa tra:**

- a. 37 e 38+6 settimane di epoca gestazionale
- b. 36 e 36+6 settimane di epoca gestazionale
- c. 34 e 35+6 settimane di epoca gestazionale

**11. L'aggiornamento dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) viene eseguito:**

- a. annualmente
- b. ogni triennio
- c. annualmente solamente nel campo ostetrico

**12. Indica quale di queste è una controindicazione all'allattamento al seno:**

- a. epatite A materna
- b. galattosemia nel neonato
- c. ingorgo mammario materno

**13. Il rischio di abortività della villocentesi è stimato intorno a:**

- a. 0,02%
- b. 1%
- c. 10%

**14. L'articolo 7 della Legge 24/2017 (Legge Gelli), prevede che:**

- a. La struttura sanitaria che si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria, solo se dipendenti della struttura stessa, risponde delle loro condotte dolose o colpose
- b. La struttura sanitaria che si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura stessa, risponde delle loro condotte dolose o colpose
- c. La struttura sanitaria che si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria, sia scelti dal paziente che dipendenti della struttura stessa, non risponde delle loro condotte dolose o colpose

**15. Nella tubercolosi latente :**

- a. la paziente è del tutto asintomatica e non contagiosa
- b. la paziente è asintomatica ma contagiosa
- c. la paziente è sintomatica ma non contagiosa

**16. L'arteria uterina è un ramo dell'arteria:**

- a. iliaca esterna
- b. iliaca interna
- c. femorale

**17. In una donna normopeso, i LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia) indicano un fabbisogno aggiuntivo di :**

- a. 69 kcal/die per il secondo trimestre di gravidanza
- b. 266 kcal/die per il secondo trimestre di gravidanza
- c. 353 kcal/die per il secondo trimestre di gravidanza

**18. In quale periodo della gravidanza il Covid-19 sembra causare infezioni più severe ?**

- a. nel primo trimestre
- b. durante tutta la gravidanza con la stessa entità
- c. nel secondo e terzo trimestre

**19. Secondo le ultime raccomandazioni sull'assistenza al parto nelle donne precesarizzate SIGO di dicembre 2021, la probabilità di successo del TOLAC (Trial of Labour After Cesarean) è:**

- a. compresa tra il 60 e l'80%, con un tasso di successo che raggiunge il 90% in caso di parto precedente vaginale o VBAC (Vaginal Birth After Cesarean) in anamnesi
- b. compresa tra il 50 e il 60%, con un tasso di successo che raggiunge il 75% in caso di parto precedente vaginale o VBAC in anamnesi
- c. compresa tra il 40 e il 50%, con un tasso di successo che raggiunge il 65% in caso di parto precedente vaginale o VBAC in anamnesi

*Domini*

**20. Quali valori sono a rischio di iperbilirubinemia clinicamente rilevante nel neonato ?**

- a. valori di TSB (total serum bilirubin) > 50°centile nelle prime 48 ore o >75° centile dopo le 48 ore di vita
- b. valori di TSB (total serum bilirubin) > 20°centile nelle prime 24 ore o >40° centile dopo le 48 ore di vita
- c. valori di TSB (total serum bilirubin) > 30°centile nelle prime 48 ore o >75° centile dopo le 48 ore di vita

**21. Nella rianimazione neonatale di un neonato <35 settimane di epoca gestazionale, la ventilazione a pressione positiva deve essere avviata:**

- a. in aria ambiente
- b. con FiO<sub>2</sub> (Frazione Inspirata di Ossigeno) di 0,21-0,30
- c. con massaggio cardiaco associato

**22. Il collirio midriatico può essere utilizzato per:**

- a. la profilassi neonatale antibiotica
- b. l'esecuzione dell'esame del riflesso rosso retinico
- c. evitare la secchezza retinica durante un intervento in anestesia generale

**23. La Fetal Growth Restriction asimmetrica è caratterizzata da:**

- a. prevalente riduzione della circonferenza cranica rispetto alla circonferenza addominale
- b. riduzione sia della circonferenza cranica che di quella addominale >10% rispetto al 50° centile delle curve di accrescimento fetale
- c. prevalente riduzione della circonferenza addominale rispetto alla circonferenza cranica

**24. Si definisce morte materna:**

- a. la morte di una donna durante la gravidanza o entro 42 giorni dal suo termine
- b. la morte per qualsiasi causa legata o aggravata dalla gravidanza
- c. entrambe le precedenti

**25. In Italia oggi sono disponibili i seguenti vaccini contro il papillomavirus:**

- a. bivalente, quadrivalente e 9-valente
- b. quadrivalente e 9-valente
- c. bivalente e 9-valente

**26. Il sintomo più precoce della colestasi è:**

- a. deficit di vitamina K
- b. dolore acuto
- c. prurito intenso alle mani e ai piedi, peggiore durante la notte

**27. Si sospetta una posizione occipito-posteriore in caso di:**

- a. sensazione di premito precoce difficilmente controllabile
- b. dolore delle contrazioni riferito a livello vulvare
- c. PROM (Premature Rupture of Membrane) con parte presentata profondamente impegnata

**28. La versione cefalica per manovre esterna è un'opzione proponibile anche quando la gestante si presenta in travaglio, a membrane integre e senza controindicazioni alla manovra:**

- a. falso
- b. solo in caso di seconda gravidanza con un parto precedente
- c. vero

**29. La somministrazione di un bolo intramuscolare di ossitocina ha un inizio dell'effetto entro circa:**

- a. 3-5 minuti
- b. 15 minuti
- c. 20 minuti

**30. L'indice di Pearl valuta:**

- a. la percentuale di rischio di insorgenza di un carcinoma mammario
- b. l'efficacia di un metodo contraccettivo
- c. il rapporto rischio-beneficio dell'utilizzo di un estroprogestinico



# ASST SS PAOLO CARLO

form  
Gentile

Concorso Pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n.2 posti di  
Collaboratore Professionale Sanitario – OSTETRICA categoria D

PROVA NON  
SOTTEGGIATA  
Mica Bay

25/03/2022

Valeriano

## PROVA 2

**1. Secondo le ultime raccomandazioni sull'assistenza al parto nelle donne precesarizzate SIGO (Società Italiana di Ostetricia e Ginecologia) di dicembre 2021, il TOLAC (Trial Of Labour After Cesarean) è controindicato in caso di:**

- pregressa rottura d'utero, in caso di pregressa incisione longitudinale classica o a T invertita e in quei casi in cui il parto vaginale sarebbe comunque controindicato, indipendentemente dalla presenza di una cicatrice uterina
- pregresso taglio cesareo con cicatrice non nota, un bishop score sfavorevole,  $\geq 2$  tagli cesarei (TC) pregressi, una pregressa rottura d'utero, in caso di pregressa incisione longitudinale classica o a T invertita e in quei casi in cui il parto vaginale sarebbe comunque controindicato, indipendentemente dalla presenza di una cicatrice uterina
- un bishop score sfavorevole,  $\geq 2$  TC pregressi, una pregressa rottura d'utero, in caso di pregressa incisione longitudinale classica o a T invertita e in quei casi in cui il parto vaginale sarebbe comunque controindicato, indipendentemente dalla presenza di una cicatrice uterina

**2. Secondo le raccomandazioni per l'assistenza alla donna vittima di violenza sessuale AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani), revisionate a maggio 2020:**

- L'ingestione incongrua di alcool si è rivelata la più frequente sostanza facilitante la violenza
- lo stato di ebbrezza alcolica della vittima costituisce un'aggravante del reato di violenza
- Tutte le precedenti

**3. Secondo l'AOGOI, le vaccinazioni dTpa (Difterite-Tetano-Pertosse acellulare) e anti-influenzale:**

- Sono raccomandate in gravidanza
- Sono raccomandate in gravidanza ma non in concomitanza l'una dell'altra, è necessario rispettare il tempo di latenza di due settimane tra le due somministrazioni
- Sono raccomandate solo se la donna non ha mai eseguito queste vaccinazioni prima della gravidanza

**4. Secondo le raccomandazioni "Monitoraggio cardiocografico in travaglio" SIGO revisionate nel 2018, durante l'auscultazione intermittente (AI), in caso di dubbi sulle caratteristiche della frequenza cardiaca fetale durante una rilevazione:**

- l'auscultazione dovrebbe essere prolungata per almeno tre contrazioni
- l'AI procede normalmente, e se persistono dubbi dopo 30 min allora solamente si passa alla cardiocografia in continuo, descrivendo il motivo in cartella clinica
- il monitoraggio per l'ora successiva va valutata caso per caso a seconda dell'andamento del travaglio

**5. L'ecografia office:**

- puo' essere eseguita solo se approvata dal medico di guardia
- non permette di identificare condizioni potenzialmente patologiche
- è eseguita come supporto e completamento della visita ostetrica finalizzato alla ricerca di dati diagnostici che possono essere utilizzati a completamento della visita stessa

**6. I segni di probabilità della gravidanza comprendono:**

- la pigmentazione della linea alba, l'aumento di volume dell'addome e le varici agli arti inferiori
- la mancanza delle mestruazioni, il segno di Chadwick e il polso vaginale di Oslander
- Tutte le precedenti

**7. L'articolo 7 della Legge 24/2017 (Legge Gelli), prevede che:**

- La struttura sanitaria che si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria, solo se dipendenti della struttura stessa, risponde delle loro condotte dolose o colpose
- La struttura sanitaria che si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura stessa, risponde delle loro condotte dolose o colpose
- La struttura sanitaria che si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria, sia scelti dal paziente che dipendenti della struttura stessa, non risponde delle loro condotte dolose o colpose

form Jennell

- 8. Se la differenza del pH tra i due campioni (arteria e vena) prelevati sul funicolo al parto è  $<0,02$  :**
- il feto era in acidosi metabolica
  - i campioni provengono dallo stesso vaso, spesso la vena
  - il feto era in acidosi respiratoria
- 9. Il CedAP (Certificato di Assistenza al Parto):**
- Consente di non inserire il nome della partorientente nel caso in cui la donna voglia partorire in anonimato
  - Non consente di non inserire il nome della partorientente nel caso in cui la donna voglia partorire in anonimato; l'anonimato riguarda soltanto il ricovero della donna in ospedale
  - Deve essere inoltrata all'ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il parto o del Comune di residenza dei genitori entro 20 gg dalla nascita, oppure entro 10gg al direttore sanitario presso la struttura ospedaliera in cui è avvenuta la nascita.
- 10. Per poter valere, l'obiezione di coscienza deve:**
- essere dichiarata per ragioni religiose
  - essere sollevata al momento dell'assunzione e depositata in direzione sanitaria
  - essere rispettata sempre. Non si è poi mai più autorizzati a partecipare alla parte operativa ne alla parte assistenziale di IVG (Interruzione Volontaria di Gravidanza), PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) e sperimentazione sugli animali.
- 11. Indica quale di queste è una controindicazione all'allattamento al seno:**
- leucinosi nel neonato
  - epatite A materna
  - ingorgo mammario materno
- 12. La tocografia esterna:**
- consente di valutare con esattezza l'intensità delle contrazioni
  - non consente di valutare con esattezza l'intensità delle contrazioni
  - consente di valutare con esattezza l'intensità delle contrazioni a seconda di come si posiziona la sonda tocografica
- 13. Quale sostanza tra quelle elencate, combinata con le indagini ecografiche, viene valutata nel bi-test ?**
- AFP
  - PAPP-A
  - estradiolo
- 14. Al punteggio di Apgar viene attribuito il valore di 1 alla frequenza cardiaca neonatale quando:**
- FC (frequenza cardiaca)  $>100$
  - FC  $<100$
  - FC  $<99$
- 15. In caso di mola vescicolare andranno monitorati fino a negativizzazione i valori di :**
- hCG
  - prolattina
  - FSH
- 16. Quale delle seguenti non è una caratteristica dell'embolia polmonare ?**
- è la più grave complicanza della TVP (Trombosi Venosa Profonda)
  - manifesta sintomatologia improvvisa
  - bradipnea importante
- 17. In una donna normopeso, i LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia) indicano un fabbisogno aggiuntivo di :**
- 120 kcal/die per il primo trimestre di gravidanza
  - 350 kcal/die per il primo trimestre di gravidanza
  - 69 kcal/die per il primo trimestre di gravidanza
- 18. La dose di Immunoglobuline anti-D effettuata a 28 settimane di epoca gestazionale è di:**
- 600 UI
  - 1500UI
  - 4000UI

*Fanni Spavulli*  
*Bo*

**19. La Bronze Baby Syndrome è causata da:**

- a. trattamento con la fototerapia di un ittero a prevalente bilirubina coniugata
- b. tempo al sole eccessivo per il neonato
- c. riflesso solare sulle pareti della culla

**20. Nella rianimazione neonatale di un neonato <35 settimane di epoca gestazionale, la ventilazione a pressione positiva deve essere avviata:**

- a. in aria ambiente
- b. con FiO<sub>2</sub> (Frazione inspirata di Ossigeno) di 0,21-0,30
- c. con massaggio cardiaco associato

**21. Il collirio midriatico può essere utilizzato per:**

- a. la profilassi neonatale antibiotica
- b. l'esecuzione dell'esame del riflesso rosso retinico
- c. evitare la secchezza retinica durante un intervento in anestesia generale

**22. La Profilassi Antibiotica Intrapartum è raccomandata in caso di:**

- a. precedente figlio con infezione neonatale invasiva da GBS (Streptococco Beta emolitico di gruppo B)
- b. batteriuria da GBS durante la gravidanza in corso
- c. tutte le precedenti

**23. Per i nati dopo la 36ma settimana di epoca gestazionale, in vista di un possibile trattamento ipotermico è opportuno mantenere il neonato già durante la stabilizzazione e il trasporto a temperatura di:**

- a. 29°C
- b. 31°C
- c. 35°C

**24. Il dolore pelvico cronico è:**

- a. dolore intermittente o costante nella parte bassa dell'addome o nella regione pelvica di durata di almeno 6 mesi
- b. dolore costante nella regione pelvica non responsiva ad antidolorifici senza durata di tempo minima
- c. conseguente al dolore pelvico acuto

**25. Si sospetta una posizione occipito-posteriore in caso di:**

- a. sensazione di premito precoce difficilmente controllabile
- b. dolore alle contrazioni riferito a livello lombosacrale
- c. tutte le precedenti

**26. La versione cefalica per manovre esterna è un'opzione proponibile anche quando la gestante si presenta in travaglio, a membrane integre e senza controindicazioni alla manovra:**

- a. vero
- b. falso
- c. solo in caso di seconda gravidanza con un parto precedente

**27. Il picco dell'LH causa:**

- a. la mestruazione
- b. l'ovulazione
- c. la lattazione

**28. E' utile che una donna in travaglio sia invitata a mangiare ogni:**

- a. 2 ore
- b. 3 ore
- c. 1 ora

**29. Lo screening pulsossimetrico delle cardiopatie congenite critiche neonatali risulta negativo se:**

- a. Saturazione O<sub>2</sub> pre e post-duttale  $\geq 95\%$  con differenza tra i due valori  $\leq 3\%$
- b. IP (indice di perfusione) pre e post-duttale  $>0,9$
- c. entrambe le precedenti

**30. L'iperemesi gravidica è caratterizzata da:**

- a. disidratazione
- b. perdita di peso  $>5\%$  del peso pregravidico
- c. Tutte le precedenti

Anna Bay Menzoni



**ASST SS PAOLO CARLO**

Scuola

form

Concorso Pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n.2 posti di  
Collaboratore Professionale Sanitario – OSTETRICA categoria D

## PROVA 3

1. **Secondo le ultime raccomandazioni sull'assistenza al parto nelle donne precesarizzate SIGO (Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia) di dicembre 2021, l'analgesia peridurale in caso di TOLAC (Trial of Labour After Cesarean):**
  - a. L'analgesia peridurale può essere offerta come parte integrante dell'assistenza ostetrica alle donne che scelgono un TOLAC e non costituisce un fattore di rischio causale per l'insuccesso del TOLAC
  - b. L'analgesia peridurale maschera i segni e i sintomi di rottura d'utero, è quindi sconsigliata
  - c. L'analgesia peridurale può essere offerta come parte integrante dell'assistenza ostetrica alle donne che scelgono un TOLAC ma costituisce un fattore di rischio causale per l'insuccesso del TOLAC
  
2. **Secondo le raccomandazioni per l'assistenza alla donna vittima di violenza sessuale AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani) revisionate a maggio 2020, lo stato di ebbrezza alcolica della vittima costituisce un aggravante del reato di violenza:**
  - a. e quindi è opportuno eseguire un prelievo per alcolemia in urgenza se la visita avviene entro le 24/48 ore dal fatto in tutti i casi di amnesia parziale o ricordo confuso dell'aggressione sessuale
  - b. ma non è necessario eseguire un prelievo per alcolemia se la donna è nota come tossicodipendente
  - c. e quindi è opportuno eseguire un prelievo per alcolemia in urgenza se la visita avviene entro le 72/96 ore dal fatto in tutti i casi di amnesia parziale o ricordo confuso dell'aggressione sessuale
  
3. **Secondo l'AOGOI, le vaccinazioni dTpa (Difterite-Tetano-Pertosse acellulare) e anti-influenzale:**
  - a. Sono raccomandate solo per la prima gravidanza e non per le successive in quanto si considera un'immunizzazione sufficiente
  - b. Sono raccomandate per tutte le gravidanze, anche se il tempo tra una gravidanza e l'altra è < 12mesi, ma solo durante il primo trimestre di gravidanza
  - c. Sono raccomandate in gravidanza
  
4. **Secondo le raccomandazioni "monitoraggio cardiocografico in travaglio" SIGO revisionate nel 2018, per il prelievo del sangue cordonale arterioso per l'identificazione del pH nel post-partum:**
  - a. deve essere eseguito a cordone clampato
  - b. deve prelevare un minimo di 3ml di sangue per poter essere lavorato correttamente dalla macchina
  - c. anche se si effettua il doppio clamp del cordone, i valori dei gas e dei lattati tendono a modificarsi dopo 15-60 minuti
  
5. **L'ecografia office eseguita da personale con formazione di base permette di:**
  - a. identificare condizioni potenzialmente patologiche
  - b. identificare il numero di embrioni/feti, la loro attività cardiaca e di quantificare l'AFI (Amniotic Fluid Index), ma non la localizzazione placentare
  - c. identificare il numero di embrioni/feti, la loro attività cardiaca e la localizzazione placentare, ma non di quantificare l'AFI
  
6. **In caso di emorragia post-partum, la trasfusione di concentrati eritrocitari dovrebbe iniziare quando l'ematocrito:**
  - a. sale al di sopra del 50%
  - b. scende al di sotto del 20%
  - c. scende al di sotto del 5%
  
7. **Cosa fa sospettare che il prelievo effettuato per la rilevazione dell'equilibrio acido-base dal funicolo al parto sia venoso e non arterioso ?**
  - a. una differenza <10mmHg tra pO2 e pCO2
  - b. una differenza >30mmHg tra pO2 e pCO2
  - c. non si può identificare

- 8. La legislazione italiana consente la raccolta e conservazione autologa e dedicata del sangue cordonale in caso sia :**
- dedicata ad un familiare, compatibile, generalmente un fratello od una sorella, affetto da una patologia per la quale è indicato un trattamento terapeutico che prevede l'utilizzo di cellule staminali emopoietiche, ma comporta un onere per la famiglia
  - dedicata ad un familiare, compatibile, generalmente un fratello od una sorella, affetto da una patologia per la quale è indicato un trattamento terapeutico che prevede l'utilizzo di cellule staminali emopoietiche
  - la legislazione italiana non consente in nessun caso la conservazione autologa, per poterla eseguire, le donne devono rivolgersi a banche estere
- 9. In una donna normopeso, i LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia) indicano un fabbisogno aggiuntivo di :**
- 69 kcal/die per il terzo trimestre di gravidanza
  - 353 kcal/die per il terzo trimestre di gravidanza
  - 496 kcal/die per il terzo trimestre di gravidanza
- 10. L'articolo 7 della Legge 24/2017 (Legge Gelli), prevede che:**
- La struttura sanitaria che si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria, solo se dipendenti della struttura stessa, risponde delle loro condotte dolose o colpose
  - La struttura sanitaria che si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura stessa, risponde delle loro condotte dolose o colpose
  - La struttura sanitaria che si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria, sia scelti dal paziente che dipendenti della struttura stessa, non risponde delle loro condotte dolose o colpose
- 11. Il "blood patch" consiste:**
- nella somministrazione di sangue autologo nello spazio epidurale in caso di puntura accidentale della dura madre
  - nel posizionamento di una garza in vagina in caso di sanguinamento eccessivo post-taglio cesareo
  - nella somministrazione di 3 sacche di emazie concentrate pre-operatoriamente se rischio di eccessiva perdita ematica
- 12. Se la durata del baby-blues supera tale periodo, si deve sospettare una depressione post-partum:**
- 2 settimane
  - 6 settimane
  - non esiste una durata indicativa, dipenderà dalla gravità dei segni
- 13. Le cause più comuni di dolore al capezzolo e al seno in allattamento sono:**
- suzione e poppate troppo frequenti e prolungate, staccare il bambino dal seno senza interruzione del vuoto
  - allattamento esclusivo, ragadi e mastite
  - attacco inadeguato al seno materno, ragadi, candida, mastite, frenulo sublinguale corto
- 14. Indica quale di queste è una controindicazione all'allattamento al seno nei paesi industrializzati:**
- HIV materno
  - epatite A materna
  - mastite in terapia antibiotica
- 15. Nel caso di gravidanza caratterizzata da vasi previ, il ricovero è raccomandato a:**
- circa 28 settimane di epoca gestazionale, in quanto il feto è in età vitale
  - 38 settimane di epoca gestazionale fino al taglio cesareo
  - nessuna delle precedenti
- 16. All'inizio del travaglio, un feto sano a termine ha un deficit di basi pari a -2mmol/L; nella fase attiva del travaglio consuma mediamente 1mmol/L ogni 3-6 ore e nel periodo espulsivo 1 mmol/L ogni ora:**
- vero
  - falso
  - vero ma il deficit di basi all'inizio del travaglio è pari a -5 mmol/L
- 17. In caso di sanguinamento vaginale in periodo post-menopausa:**
- l'ecografia transvaginale è l'esame goldstandard
  - la biopsia va eseguita di routine
  - per eliminare qualsiasi dubbio di carcinoma andrà eseguita l'isterectomia

- 18. Prima della 34esima settimana di epoca gestazionale, una linea di base di 160bpm (battiti per minuto) puo' essere considerata fisiologica:**
- falso
  - vero
  - vero ma solo se la donna è in travaglio
- 19. Le decisioni terapeutiche del trattamento dell'iperbilirubinemia neonatale vanno prese in base al valore:**
- della bilirubina sottocutanea
  - della bilirubina sierica
  - tutte le risposte
- 20. Nella rianimazione neonatale di un neonato <35 settimane di epoca gestazionale, la ventilazione a pressione positiva deve essere avviata:**
- in aria ambiente
  - con FiO2 (Frazione inspirata di Ossigeno) di 0,21-0,30
  - con massaggio cardiaco associato
- 21. Il collirio midriatico può essere utilizzato per:**
- la profilassi neonatale antibiotica
  - l'esecuzione dell'esame del riflesso rosso retinico
  - evitare la secchezza retinica durante un intervento in anestesia generale
- 22. La scala NIPS è:**
- la scala di valutazione della consistenza della cervice uterina
  - la scala di valutazione del colore dell'urina
  - la scala di rilevazione del discomfort neonatale
- 23. In una donna vegetariana/vegana, si può valutare prevalentemente una carenza di vitamina:**
- B12
  - K
  - D
- 24. Controindicazione all'uso del propofol per l'anestesia in ostetricia:**
- allergia alla soia
  - intolleranza ai curari
  - intervento di legatura delle tube durante un taglio cesareo
- 25. Si sospetta una posizione occipito-posteriore in caso di:**
- sensazione di premito precoce difficilmente controllabile
  - dolore delle contrazioni riferito a livello vulvare
  - PROM (Premature Rupture of Membranes) con parte presentata profondamente impegnata
- 26. Il Turtle sign è :**
- l'arresto della spalla posteriore sopra la sinfisi pubica
  - la retrazione parziale dell'estremo cefalico in vagina dopo il disimpegno della parte presentata
  - la mancata rotazione dell'estremo cefalico dopo l'affiorare delle guance alla rima vulvare
- 27. Secondo le raccomandazioni per la prevenzione ed il trattamento della Malattia Emolitica del Feto e del Neonato (MEFN) del 2014 della SIMTI (Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia):**
- la MEFN si verifica nella maggior parte dei casi nella prima gravidanza per sensibilizzazione precedente
  - in caso di MEFN la risposta immunitaria è sempre della stessa entità, con gli stessi sintomi
  - l'anticorpo anti-D è quello più frequentemente responsabile della MEFN
- 28. In caso di embolia da liquido amniotico, l'obiettivo assistenziale primario è :**
- mantenere la pressione arteriosa sistolica > 90 mmHg, la pO2 > 60 mmHg e la diuresi > 25ml/h
  - il trasferimento immediato in rianimazione per la conduzione medica
  - la somministrazione di antistaminici

**29. Secondo le raccomandazioni SIGO del 2014 sul rischio tromboembolico in gravidanza e in puerperio, prima di somministrare la profilassi antitrombotica con eparina a basso peso molecolare in puerperio, occorre attendere un intervallo di sicurezza, pari a:**

- a. almeno 6 ore dalla rimozione del catetere peridurale, 12 ore dal blocco centrale per un TC (taglio cesareo) e di 6 ore dopo un parto vaginale
- b. 12 ore dal blocco centrale per un TC e di almeno 6 ore alla rimozione del catetere peridurale, non esiste nessun tempo di sicurezza post parto vaginale
- c. 12 ore minimo dal parto vaginale/TC

**30. La versione cefalica per manovre esterna è un'opzione proponibile anche quando la gestante si presenta in travaglio, a membrane integre e senza controindicazioni alla manovra:**

- a. vero
- b. falso
- c. solo in caso di terza gravidanza con due parti precedenti