

CASSISA GIUSEPPE 09/07/2024 - PRDVA ESTRATTA
CARMELA CRISTINA

Giuseppe Cassisa


Sistema Socio Sanitario
 Regione Lombardia
ASST Santi Paolo e Carlo

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI FISIOTERAPISTA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI- A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

COMPITO SCRITTO 1

- 1) Azione del muscolo tensore della fascia lata:
 - a) Estende il ginocchio e abduce l'anca
 - b) Flette il ginocchio e abduce l'anca
 - c) Estende l'anca e flette il ginocchio

- 2) Origine del tibiale posteriore:
 - a) Condilo femorale mediale
 - b) Membrana interossea e superfici ossee di tibia e perone
 - c) Porzione laterale della tibia

- 3) Quale nervo è interessato nella sindrome del tunnel carpale:
 - a) Nervo ulnare
 - b) Nervo mediano
 - c) Nervo radiale

- 4) Azione del muscolo trasverso:
 - a) Estende la colonna
 - b) Ruota e flette la colonna
 - c) Flette l'anca

- 5) Qual è l'eziologia della sindrome di Guillain-Barrè:
 - a) Tossica
 - b) Infiammatoria
 - c) Tutte le precedenti

- 6) Cosa può causare il diabete:
 - a) Polineuropatia
 - b) Paraplegia spastica
 - c) Emiplegia

- 7) Caratteristiche del cammino atassico:
- a) Assenza del pendolarismo degli arti superiori
 - b) Base allargata
 - c) Cammino festinante
- 8) Quale struttura anatomica è lesionata nel morbo di Parkinson:
- a) Verme cerebellare
 - b) Ipotalamo
 - c) Sostanza Nigra
- 9) Quali sono le caratteristiche del paziente con morbo di Parkinson:
- a) Tremore, bradicinesia, rigidità
 - b) Tremore, paralisi, parestesie
 - c) Atassia, tremore, bradicinesia
- 10) La scala di valutazione Asia viene utilizzata nel paziente con:
- a) Lesione cerebrale
 - b) Lesione periferica
 - c) Lesione midollare
- 11) La sindrome da spinta è caratteristica di quale patologia:
- a) Lesione cerebellare
 - b) Lesione periferica
 - c) Lesione cerebrale
- 12) La scala di valutazione Berg viene usata per:
- a) Disturbi del linguaggio
 - b) Disturbi dell'equilibrio
 - c) Alterazioni del tono
- 13) La scala di Barthel misura:
- a) Il grado di autonomia di un paziente nella vita quotidiana
 - b) La saturazione dell'ossigeno
 - c) Il rischio di caduta

14) L'articolazione scapolo-omeroale è:

- a) Una trocoide
- b) Un piano di scorrimento
- c) Un' enartrosi

15) I valori di CO₂ nel sangue:

- a) Variano con l'età riducendosi
- b) Non variano con l'età del soggetto
- c) Sono ridotti nei soggetti ipercapnici

16) Il paziente BPCO:

- a) E' solitamente un paziente molto giovane
- b) E' un paziente cronico
- c) E' un paziente che risolve i suoi disturbi con la sola terapia farmacologica

17) Le OSAS vengono trattate :

- a) Soltanto con i farmaci
- b) Con la CPAP , con la postura nel letto ed eventualmente la perdita di peso
- c) Soltanto in fase grave

18) Cos'è importante recuperare in un paziente con intervento di protesi di ginocchio in elezione:

- a) L'estensione completa
- b) La flessione almeno fino a 90°
- c) Tutte le precedenti

19) Un paziente con polineuropatia presenta:

- a) Nistagmo
- b) Ipoestesia
- c) Afasia

20) Un paziente con ridotta iniziativa motoria, impaccio motorio e rigidità potrebbe presentare:

- a) Lombosciatalgia
- b) Malattia di Parkinson
- c) Paralisi di Bell

  MB

CA 7199A GIUDIZI E 09/07/24 - PROVA NON ES TRATTA
CAMPURA OMBINA


Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Santi Paolo e Carlo

Giuseppe Lonina



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI FISIOTERAPISTA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI- A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

COMPITO SCRITTO 2

- 1) Le vertigini di origine vestibolare sono caratterizzate da :
 - a. Nistagmo
 - b. Deficit della sensibilità
 - c. Riduzione della forza

- 2) Il carico è controindicato in terza giornata post intervento:
 - a. Nelle protesi d'anca
 - b. Nelle protesi di ginocchio
 - c. Nelle sintesi di frattura trimalleolare

- 3) L'ictus ischemico cerebrale può determinare:
 - a. Alterazione del tono
 - b. Deficit della sensibilità somatoestesica
 - c. Tutte le precedenti

- 4) L'elettromiografia è un esame strumentale per indagare:
 - a. La conduzione dei nervi periferici
 - b. L'insufficienza venosa
 - c. La lesione del primo motoneurone

- 5) Una lesione emisferica cerebrale destra determina:
 - a. Un'emi sindrome destra
 - b. Un'emisindrome sinistra
 - c. Una paraparesi

- 6) Il piede cadente può essere causato da:
- a) BPCO
 - b) Artrosi del ginocchio
 - c) Diabete
- 7) Il deficit di circolazione periferica nel paziente diabetico può causare:
- a) Deficit sensitivo
 - b) Amputazione
 - c) Tutte le precedenti
- 8) In un'ernia del disco L2 è positivo il test di:
- a) Lasegue
 - b) Wasserman
 - c) Jobe
- 9) L'iperreflessia è un segno di:
- a) Lesione centrale
 - b) Lesione periferica
 - c) Frattura del femore
- 10) L'iporeflessia del rotuleo:
- a) Assonotmesi del nervo femorale
 - b) Assonotmesi del nervo sciatico
 - c) Lesione midollare
- 11) La molla di Codivilla si utilizza per:
- a) Lesione del nervo radiale
 - b) Lesione del nervo otturatorio
 - c) Lesione dello sciatico popliteo esterno
- 12) I dermatomeri sono correlati a :
- a) Nervo terminale
 - b) Alle aree cerebrali
 - c) Alle radici nervose


  TB

- 13) Per valutare la forza di grado 2 MRC del muscolo deltoide come si posiziona il paziente:
- a) Decubito laterale
 - b) Supino
 - c) Seduto
- 14) Per valutare la forza di grado 2 MRC del muscolo tensore della fascia lata come si posiziona il paziente:
- a) Decubito laterale
 - b) Supino
 - c) In stazione eretta
- 15) Per valutare la prono-supinazione dell'avambraccio il gomito deve essere:
- a) Esteso
 - b) Flesso
 - c) E' indifferente
- 16) In una retrazione bilaterale del muscolo tricipite surale il paziente in stazione eretta si presenta:
- a) Retropulso
 - b) Anteropulso
 - c) Lateropulso
- 17) Il segno di Duchenne a destra si presenta con:
- a) Retropulsione
 - b) Caduta della spalla a sinistra
 - c) Caduta della spalla a destra
- 18) Il segno di Trendelemburg a destra si presenta con:
- a) Caduta del bacino a sinistra
 - b) Caduta del bacino a destra
 - c) Retropulsione
- 19) La festinazione è un cammino tipico del paziente:
- a) Midollare
 - b) Cerebrale
 - c) Parkinsoniano

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are two distinct signatures, one appearing to be 'AS' and the other 'MB' with a large flourish.

20) La dismetria è segno di una lesione:

- a) Talamica
- b) Cerebellare
- c) Protrusione C6

Handwritten signature and initials, possibly 'MB' or 'YB', located in the bottom right corner of the page.

CAMERA QUISINA 09/07/2024
CASISSA GIUSEPPE

PROVA NON ESTRANEA

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Santi Paolo e Carlo

Giuseppe Corina
ASST Santi Paolo e Carlo
Via Antonio
Di Rudini, 8
20142 Milano

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI FISIOTERAPISTA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI- A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

COMPITO SCRITTO 3

- 1) La disostruzione bronchiale:
 - a) È importante solo nei pazienti tracheostomizzati
 - b) È una delle attività per migliorare gli scambi gassosi
 - c) Si avvale di pochissime tecniche

- 2) Cosa misura la scala MRC:
 - a) La forza muscolare
 - b) La sensibilità
 - c) L'ipertono


- 3) Il corsetto C35 è indicato in quali fratture:
 - a) Fratture amieliche
 - b) Fratture della scapola
 - c) Fratture clavicola

- 4) Cute arrossata calda e gonfiore possono essere segni tipici di:
 - a) Ipotensione
 - b) Rigidità articolare
 - c) Flebite

- 5) Il carico è controindicato in terza giornata post intervento:
 - a) Nelle protesi d'anca
 - b) Nelle protesi di ginocchio
 - c) Nelle sintesi di frattura trimalleolare

MB

- 6) L'ictus ischemico cerebrale può determinare:
- a) Alterazione del tono
 - b) Deficit della sensibilità somatoestesica
 - c) Tutte le precedenti
- 7) L'elettromiografia è un esame strumentale per indagare:
- a) La conduzione dei nervi periferici
 - b) L'insufficienza venosa
 - c) La lesione del primo motoneurone
- 8) In un'ernia del disco L2 è positivo il test di:
- a) Lasegue
 - b) Wasserman
 - c) Jobe
- 9) L'iperreflessia è un segno di:
- a) Lesione centrale
 - b) Lesione periferica
 - c) Frattura del femore
- 10) I dermatomeri sono correlati a :
- a) Nervo terminale
 - b) Alle aree cerebrali
 - c) Alle radici nervose
- 11) Per valutare la forza di grado 2 MRC del muscolo deltoide come si posiziona il paziente:
- a) Decubito laterale
 - b) Supino
 - c) Seduto
- 12) In una retrazione bilaterale del muscolo tricipite surale il paziente in stazione eretta si presenta:
- a) Retropulso
 - b) Anteropulso
 - c) Lateropulso



Handwritten signature and initials MB.

- 13) Il segno di Duchenne a destra si presenta con:
- a) Retropulsione
 - b) Caduta della spalla a sinistra
 - c) Caduta della spalla a destra
- 14) La festinazione è un cammino tipico del paziente:
- a) Midollare
 - b) Cerebrale
 - c) Parkinsoniano
- 15) Un paziente che dopo assunzione di liquidi tossisce può essere:
- a) Disfagico
 - b) Afasico
 - c) Tachipnoico
- 16) Tra i segni tipici della sclerosi multipla possiamo trovare:
- a) Atteggimento camptocormico
 - b) Ipertono
 - c) Lesione della cauda equina
- 17) Un paziente che assume betabloccanti è un paziente:
- a) Diabetico
 - b) Ipotiroideo
 - c) Cardiopatico
- 18) Nel paziente gravemente emiparetico con lesione cerebrale destra il capo è atteggiato:
- a) A destra
 - b) A sinistra
 - c) Sulla linea mediana
- 19) Si definisce eterometria:
- 1) La differenza di lunghezza tra due arti
 - 2) Il raggiungimento preciso di un target
 - 3) E' un parametro della funzionalità respiratoria

OR

MB

20) L'incontinenza da urgenza è caratterizzata da:

- a) Anuria
- b) Perdite urinarie sotto sforzo
- c) Frequenza minzionale aumentata

PO
AD
IB