


**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N.30
POSTI PER INFERMIERE - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA
SALUTE E DEI FUNZIONARI -**




PROVA PRATICA N.1

1. Un paziente anziano con frattura di femore presenta disorientamento e agitazione notturna.
Qual è l'intervento più appropriato?
 - a. Sostituire il catetere vescicale
 - b. Rinnovare la medicazione del sito chirurgico
 - c. Garantire il comfort, ridurre la stimolazione sensoriale ed avvisare il medico se necessario
2. In caso di iniezione intramuscolare, il farmaco somministrato viene assorbito attraverso:
 - a. La mucosa nasale
 - b. Il tessuto adiposo
 - c. Il tessuto muscolare
3. Qual è la posizione indicata da far assumere al paziente per l'inserimento di un catetere vescicale a permanenza ad un soggetto adulto di sesso maschile?
 - a. Posizione supina
 - b. Posizione laterale
 - c. Posizione prona
4. Nell'inserimento di un sondino naso-gastrico occorre prestare attenzione a:
 - a. Comparsa di vomito, tosse, difficoltà respiratoria
 - b. Comparsa di edemi declivi
 - c. Comparsa di ipoacusia
5. Un paziente terminale riferisce dolore non controllato nonostante la terapia farmacologica.
Cosà deve fare l'infermiere?
 - a. Spiegare che il dolore è inevitabile
 - b. Valutare il dolore e mettere in atto interventi appropriati, informare il medico
 - c. Ritardare la somministrazione di un antidolorifico per evitare dipendenza
6. Una lesione da pressione al 4° stadio viene definita come:
 - a. Cute intatta con arrossamento non sbiancabile in zona adiacente o opposta a una prominenzia ossea
 - b. Escoriazione
 - c. Necrosi dei tessuti con formazione di escara

7. Al fine di garantire la corretta raccolta di un campione per urinocoltura:
 - a. E' possibile effettuare la raccolta in un qualsiasi contenitore
 - b. E' necessario evitare di contaminare il contenitore sterile della raccolta urine
 - c. Non è necessario utilizzare nessuna precauzione
8. Per l'esecuzione del prelievo venoso l'infermiere:
 - a. Esegue il lavaggio delle mani
 - b. Deve sempre indossare i guanti sterili
 - c. Deve sempre attribuire l'attività all'operatore socio-sanitario
9. Prima di posizionare un catetere vescicale a permanenza su un paziente adulto vigile e orientato, l'infermiere:
 - a. Acquisisce il consenso dell'assistito
 - b. Non è tenuto a spiegare la procedura che andrà a compiere
 - c. Non è tenuto a identificare correttamente il paziente
10. Per inserire il sondino naso gastrico ad un paziente adulto, vigile e orientato l'infermiere:
 - a. Posiziona il paziente sdraiato
 - b. Posiziona il paziente seduto o semiseduto
 - c. Posiziona il paziente prono

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N.30
POSTI PER INFERMIERE - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA
SALUTE E DEI FUNZIONARI -**

PROVA PRATICA N°2



1. Un paziente con catetere venoso centrale presenta iperpiressia e arrossamento in sede di inserzione. Quale sospetto è più probabile?
 - a. Psoriasi
 - b. Infezione del catetere
 - c. Dermatite seborroica


2. In un paziente portatore di colostomia la pulizia della cute peristomale viene solitamente effettuata con:
 - a. Acqua e sapone neutro
 - b. Soluzione antisettica
 - c. Soluzione alcolica

3. Il polso arterioso può essere apprezzabile:
 - a. In sede auricolare
 - b. In sede radiale a livello del polso
 - c. In sede lombare

4. Quale tra i termini elencati non indica un parametro vitale?
 - a. Frequenza cardiaca
 - b. Pressione arteriosa
 - c. Altezza

5. Dopo aver posizionato un sondino naso gastrico l'infermiere:
 - a. Procede al fissaggio del sondino per evitare lo spostamento
 - b. Gonfia il palloncino
 - c. Non è necessario fissare il sondino

6. Una donna con pregresso ictus presenta disfagia. Quale azione è più indicata?
 - a. Invitare ad assumere abbondanti liquidi per via orale
 - b. Digiunare
 - c. Usare addensanti per i liquidi
7. Al fine di evitare punture accidentali l'infermiere deve:
 - a. Sempre rincappucciare l'ago
 - b. Smaltire l'ago nell'apposito contenitore per oggetti taglienti
 - c. Riutilizzare l'ago
8. Prima dell'esecuzione dell'insulina terapia, l'infermiere deve:
 - a. Controllare la pressione arteriosa
 - b. Controllare la glicemia
 - c. Controllare la temperatura corporea
9. Cosa si deve fare prima di somministrare un farmaco per via orale?
 - a. Verificare il nome e la data di scadenza del farmaco
 - b. Non è necessario fare nulla
 - c. Non identificare il dosaggio
10. Quale delle seguenti azioni è fondamentale durante una medicazione di una ferita chirurgica?
 - a. Lasciare la ferita aperta per farla respirare
 - b. Eseguire la disinfezione con alcol in soluzione concentrata al 99,9%
 - c. Eseguire la disinfezione procedendo dall'interno verso l'esterno

NON ESTRATTA 10/04/2025  Milano, 10/04/2025

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N.30
POSTI PER INFERMIERE - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA
SALUTE E DEI FUNZIONARI -**

PROVA PRATICA N°3



1. Un paziente in fase post operatoria presenta fuoriuscita di liquido purulento del drenaggio.
Quale attività dovrà intraprendere l'infermiere?
 - a. Rimuovere immediatamente il drenaggio
 - b. Rinnovare la medicazione ogni 12 ore
 - c. Avvisare medico
2. L'igiene delle mani:
 - a. Non è necessaria se si sostituiscono i guanti tra un paziente e l'altro
 - b. È indicata solo prima di qualsiasi procedura invasiva
 - c. Rappresenta la misura principale per la prevenzione delle infezioni ospedaliere
3. Quando è necessario indossare un dispositivo di protezione individuale?
 - a. Solo durante l'esecuzione dell'emocoltura
 - b. Quando si è a contatto con pazienti infetti o potenzialmente infetti
 - c. Non è mai necessario
4. Come deve essere eseguita la medicazione di una ferita chirurgica?
 - a. Utilizzando tecnica no touch e materiale sterile
 - b. Non è necessario garantire la sterilità se la ferita è piccola
 - c. Utilizzando sempre e solo materiale non sterile, come garze normali
5. In caso di ostruzione delle prime vie aeree:
 - a. Eseguire la manovra Heimlich
 - b. Eseguire elettrocardiogramma
 - c. Eseguire un prelievo arterioso

6. In caso di ematuria franca in paziente portatore di catetere vescicale a permanenza è necessario:
 - a. Valutare con il personale medico l'eventuale posizionamento di lavaggio vescicale
 - b. Clampare immediatamente il catetere vescicale per fermare il sanguinamento
 - c. Rimuovere il catetere vescicale e non avvisare medico
7. Cosa si deve fare prima di somministrare un farmaco per via endovenosa?
 - a. Non è necessario fare nulla
 - b. Attribuire l'attività all'operatore socio sanitario
 - c. Verificare il nome e la data di scadenza del farmaco
8. Dopo la rimozione del catetere vescicale è indicato?
 - a. Controllare la prima minzione
 - b. Lasciare a digiuno il paziente per 4-6 ore
 - c. Somministrare un antipertensivo
9. Durante la somministrazione di un farmaco per via endovenosa il paziente riferisce bruciore in sede di infusione. Come deve procedere l'infermiere?
 - a. Interrompere la somministrazione del farmaco e valutare il sito di inserzione
 - b. Continuare la somministrazione aumentandone la velocità di infusione
 - c. Non intervenire
10. Un assistito con ridotta mobilità e incontinenza urinaria presenta arrossamento in sede sacrale che non scompare alla digitopressione. Quale azione deve intraprendere l'infermiere?
 - a. Rimuovere il materasso antidecubito
 - b. Variare il decubito e mobilizzare il paziente almeno ogni 2 ore
 - c. Sostituire 2 volte al giorno il catetere vescicale