



PREPARAZIONE ALLA COLONSCOPIA : CASI PARTICOLARI

Per i pazienti a rischio di inadeguata preparazione (stitici cronici, diabetici, affetti da patologie neurologiche, soggetti allettati, con pregressa chirurgia, o in soggetti anziani) si raccomandano alcuni schemi di preparazione intestinale alternativi:

PREPARAZIONE RINFORZATA AD ALTO VOLUME

1: evitare già da 5 giorni prima dell'esame l'assunzione di fibre o scorie vegetali (frutta, verdura, prodotti integrali- VEDI Tabella DIETA), poi il giorno precedente l'esame assumere una dieta liquida.

2: Assumere nei 5 giorni precedenti l'esame un prodotto a base di Macrogol in basso dosaggio reperibili in farmacia (es. MOVICOL® Soluzione os 25ml) una bustina 2 volte al giorno.

3: Assumere un preparato ad alto volume SELG-ESSE, iniziando il giorno precedente l'esame (vedi preparazioni intestinali)

PREPARAZIONE RINFORZATA A BASSO VOLUME

1: evitare già da 5 giorni prima dell'esame l'assunzione di fibre o scorie vegetali (frutta, verdura, prodotti integrali- VEDI Tabella DIETA), poi il giorno precedente l'esame assumere una dieta liquida.

2: Assumere nei 5 giorni precedenti l'esame un prodotto a base di Macrogol in basso dosaggio reperibili in farmacia (es. MOVICOL® Soluzione os 25ml) una bustina 2 volte al giorno.

3: Assumere un preparato a basso volume (es. CLENSIA) , iniziando il giorno precedente l'esame (vedi preparazioni intestinali)

PREPARAZIONE RINFORZATA CON LASSATIVO STIMOLANTE

Due giorni prima dell'esame: alle ore 17.00 assumere 3 compresse di Bisacoldile 5 mg



Se la colonscopia è prevista al mattino:

• **Il giorno prima dell'esame**

- ✓ Alle ore 15:00-16.00 assumere 3 compresse di BISACODILE 5 MG .
- ✓ Alle ore 17-18,00 iniziare l'assunzione della soluzione di CLENSIA : 250 ml ogni 15 min., fino ad esaurimento dei 2 litri.

Se la colonscopia è prevista in tarda mattinata:

Il giorno prima dell'esame

- ✓ Alle ore 15:00-16.00, assumere 3 compresse di BISACODILE 5 mg .
- ✓ Alle ore 17:00-18,00 iniziare ad assumere 1 litro di CLENSIA (2 buste) in circa 1 ora.

Il giorno dell'esame:

- ✓ Alle ore 6,00-7,00 iniziare ad assumere il secondo litro di CLENSIA (2 buste) in circa 1 ora.

Se la colonscopia è prevista al pomeriggio:

Il giorno prima dell'esame,

- ✓ Alle ore 15:00-16.00, assumere 3 compresse di BISACODILE 5 mg
- ✓ Alle ore 17:00-18,00 iniziare ad assumere 1 litro di CLENSIA (2 buste) in circa 1 ora.

Il giorno dell'esame:

- ✓ Alle ore 6,00-7,00 iniziare ad assumere il secondo litro di CLENSIA (2 buste) in circa 1 ora.